HTA d'origine rénale parenchymateuse

Christelle Barbet

Tours

14 mars 2009

Généralités

- Néphropathies chroniques parenchymateuses: 1^{ère} cause d'HTA secondaire (3 à 5 %)
- Les principales causes néphrologiques:
  - glomérulopathies aiguës
  - néphropathies vasculaires aiguës
  - néphropathies affectant la médullaire rénale:
    - polykystose rénale
    - maladies kystiques de la médullaire
  - néphropathie de reflux
  - insuffisance rénale chronique avancée

Quand penser à l'HTA d'origine parenchymateuse?

- Devant des ATCD évocateurs:
  - familiaux:
    - ex: polykystose rénale
  - personnels:
    - ex: cure de reflux vésico-urétéral dans l'enfance
- Devant des anomalies biologiques compatibles:
  - prise de sang:
    - élévation de la créatinine plasmatique ou une diminution du DFG
  - analyse d'urines:
    - protéinurie ou « albumine à la BU de la médecine du travail »
    - anomalies du sédiment urinaire
      - ex: hématurie isolée dans la néphropathie à IgA au stade initial

Mécanismes physiopathologiques

- Plusieurs mécanismes souvent associés:
  - rétention hydrosodée
  - stimulation du SRAA
  - stimulation du SN sympathique (vasoconstriction artérioles glomérulaires)

Mécanisme physiopathologique: SRAA

- Plusieurs mécanismes souvent associés:
  - rétention hydrosodée
  - stimulation du SRAA: actions de l'angiotensine II
    - circulation:
      - le plus puissant vasoconstricteur
      - action directe sur les artérioles
      - donc $\uparrow$ PA
    - SNC:
      - mécanisme de la soif (hypothalamus)
      - régulation du besoin de sel
    - corticosurrénale:
      - stimulation de la sécrétion de l'aldostérone
    - rein:
      - vasoconstricteur
      - rétention rénale de Na^+

Mécanisme physiopathologique: SN sympathique

- Plusieurs mécanismes souvent associés:
  - rétention hydrosodée
  - stimulation du SRAA
  - stimulation du SN sympathique (vasoconstriction artérioles glomérulaires)

Glomérulopathies aiguës

- Une des glomérulopathies les plus hypertensives :
  - la glomérulonéphrite post-streptococcique
    - population: enfant ++
    - contexte infectieux récent:
      - souvent ORL dans les 2 à 3 semaines précédentes
    - syndrome néphritique avec IRA modérée et résolutive spontanément
    - PBR non systématique: prolifération endocapillaire
- L'HTA au cours des glomérulopathies:
  - souvent présente même avec une fonction rénale normale
- Mécanisme prédominant:
  - rétention hydrosodée

Néphropathies vasculaires

La crise aiguë sclérodermique

- Complication grave chez 15% des sclérodermiques:
    - dans les 3 à 5 ans après le début de la maladie
    - facteurs de risque: atteinte cutanée diffuse, mois froids, sujets noirs
  - Histologie:
    - prolifération intimale
    - occlusion vasculaire
    - ischémie glomérulaire
-
- Mécanisme: stimulation du SRAA par l'ischémie corticale
  - Crise rénale sévère, définie par:
    - IR rapidement progressive avec chute de la diurèse sans autre étiologie que la sclérodermie
    - et/ou HTA sévère d'emblée (mais peut être absente)
  - Pronostic selon les IEC:
    - avant IEC: 10% survie à un an
    - après IEC: 65% survie à 5 ans

Néphropathie affectant la médullaire

Polykystose hépato-rénale familiale

- La néphropathie héréditaire la plus fréquente en France
  - 10% des IRCT
- Transmission autosomique dominante
  - 85% PKD1 (chromosome 16)
  - 15% PKD2 (chromosome 4)
- HTA dans la PKR:
  - fréquente et précoce:
    - 50 à 75 % des patients: avant l'IRC
    - 100 % au stade d'IRCT
  - prévalence HTA: PKD1 > PKD2
  - HTA rénine-dépendante liée à l'ischémie rénale (kystes?)
- Traitement initial de l'HTA dans la PKR : IEC

Néphropathie de reflux

Aspect de petit rein bosselé uni- ou bilatéral
avec parfois hypoplasie segmentaire

Cicatrice rénale

Conséquence de l'association de:
reflux vésico-urétéral
reflux intra-rénal
infections urinaires récurrentes

Néphropathie de reflux

- Epidémiologie:
  - enfant
  - adulte jeune ou d'âge moyen
- L'HTA de la néphropathie de reflux:
  - conséquence des cicatrices corticales rénales
  - mécanisme essentiel: hypersécrétion de rénine par l'ischémie segmentaire corticale
  - la plus fréquente des HTA sévères de l'enfant
  - accélère l'évolution vers l'IRCT
- Traitement:
  - chirurgical: ablation de la zone hypoplasique ou rarement néphrectomie
  - médical: IEC ou ARA2 en première intention

HTA et IRC

- L'HTA s'associe au risque cardiovasculaire du fait de:
  - altération de la fonction rénale
  - protéinurie
- Selon le stade des néphropathies:
  - avant l'IRC: l'HTA est fonction des néphropathies:
    - très hypertensives: GN post-streptococcique
    - peu hypertensives: NP tubulo-interstitielle chronique
  - au stade de l'IRC: l'HTA est fonction:
    - de la néphropathie sous-jacente
    - du stade de l'IRC:
      - augmentation linéaire de la prévalence de HTA avec le stade d'IRC:
        - 85 ml/min: 65% HTA
        - 15 ml/min: 95% HTA
- Caractéristiques de l'HTA:
  - souvent sévère et difficilement contrôlée
  - diminution de la PA nocturne moins fréquente (plus de non-dippers)

Incidence de l'IRC selon le niveau de PA

Figure 1 : Stratégie thérapeutique

<< : inférieure à 130/80 mmHg, et plus basse si possible
 * ARA2 si diabétique de type 2 et IEC dans les autres cas
 ° diurétiques thiazidique ou de l'anse en fonction de la sévérité de l'IRC

Traitement spécifique au cours de certaines néphropathies

- Glomérulopathies aiguës et néphropathies vasculaires aiguës associées à une rétention hydrosodée:
  - diurétiques en 1^{ère} intention
- Sclérodermie, vascularite et SAPL:
  - IEC et ARA2 en 1^{ère} intention
- Néphropathies chroniques:
  - IEC ou ARA2 en 1^{ère} intention
  - normalisation de la volémie par diurétiques à doses progressivement croissantes (parfois jusqu'à 1,5 gr/jour)
  - souvent polythérapie

Surveillance du traitement par IEC/ARA2

- Mise en route du traitement:
  - à volémie normale
  - à distance d'une IRA
- A l'initiation du traitement:
  - risque d'IRA par perte de l'autorégulation rénale (même sans SAR)
- Savoir arrêter transitoirement les IEC/ARA2:
  - lors des périodes à risque de déshydratation
- Surveillance de la créatinine et de la K⁺:
  - 7 à 10 jours après le début du traitement
  - ne pas hésiter à contrôler lors des périodes à risque de déshydratation

Intérêt du traitement antihypertenseur sur la fonction rénale

144 / 97 mmHg
↓
128 / 84 mmHg

10 diabétiques de type I

Progression de la néphropathie diabétique selon le contrôle de la PA

Intérêt du contrôle de la PA sur les complications cardio-vasculaires

Patients avec une néphropathie diabétique

Complications CV (HOT)

Lancet 1998; 351: 1755-62

Complications microvasculaires (UKPDS)

PA atteinte: 144/82 vs 154/87 mmHg

UKPDS 38, BMJ 1998

Thérapeutique agressive pour atteindre l'objectif tensionnel

Objectifs thérapeutiques au cours de l'IRC

- 2 objectifs:
  - réduire le risque cardiovasculaire
  - ralentir la progression de l'insuffisance rénale

- Moyens:
  - cibles tensionnelles < 130/80 dès que possible
  - réduire la protéinurie < 0,5 g/jour dès que possible
  - éviter les néphrotoxiques dont les AINS
  - EPO prescrite seulement si PA contrôlée
  - limiter les apports sodés (< 6 gr/jour)
  - contrôler les facteurs de risque CV

But de l'intervention thérapeutique: ralentir la progression de l'IRC

Le rein: victime ou coupable de l'HTA

- Présentation de la néphropathie ischémique:
  - contexte d'HTA
  - IRC
  - protéinurie: absente ou faible
  - sédiment urinaire normal
  - reins symétriques à contours normaux
- Diagnostics différentiels nombreux
- Néphropathie ischémique plutôt secondaire à:
  - insulino-résistance
  - obésité
- Néphropathie ischémique:
  - plus souvent cause que conséquence de l'HTA

Néphropathie ischémique: difficultés diagnostiques

Diagnostique clinique

Diagnostique histologique

US Renal data System, AJKD 2005

{hp.4} Adjusted ESRD incident rates, by primary diagnosis, & diabetes in the general population

	Patients	%
Glomerulonephritis	76	56.3
Atrophic pyelonephritis (Reflux nephropathy)	25	18.5
Polycystic and medullary cystic	15	11.1
Essential hypertension	2	1.5
Analgesic nephropathy	1	0.7
Other specified	11	8.2
	130	

130 patients binéphrectomisés
Kincaid-Smith, NDT 1999

HTA en transplantation rénale

- Rappels:

- Mécanismes particuliers:

- traitements immunosuppresseurs:
  - corticoïdes (rétention hydrosodée)
  - anti-calcineurines (effet vasoconstricteur rénal)
- néphropathie initiale
- sténose sur l'artère du greffon ou plus rarement reins natifs
- rejets aigus ou chroniques
- prise de poids post-transplantation

Conclusion

- Penser à une HTA d'origine parenchymateuse:
  - dès l'interrogatoire
  - sur des anomalies biologiques
- Atteindre dès que possible les objectifs thérapeutiques:
  - PA < 130/80
  - protéinurie < 0,5 gr/24h
  - correction des FRDCV
- Privilégier dans la plupart des cas les IEC/ARA2